

| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 用途名称 | 登録年月日 | 有効期間 | 樹種名等 | 病害虫名称 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|-------|--------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|
| 14685 | メプロニル水和剤 | バンタック水和剤75 | 殺菌剤 | 1981/8/7 | 2011/8/6 | せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | - | 発病初期 | 3回以内 | 散布 |
| 14685 | メプロニル水和剤 | バンタック水和剤75 | 殺菌剤 | 1981/8/7 | 2011/8/6 | やなぎ | さび病 | 1000倍 | - | 発病初期 | - | 散布 |
| 15475 | トリアジメホン乳剤 | パイレトン乳剤 | 殺菌剤 | 1983/4/22 | 2010/4/21 | やなぎ | さび病 | 1000倍 | | - | - | 散布 |
| 15871 | メプロニル水和剤 | クリーングラス水和剤 | 殺菌剤 | 1984/9/28 | 2011/9/27 | やなぎ | さび病 | 1000倍 | | - | 8回以内 | 散布 |
| 17687 | マイクロブタニル乳剤 | ラリー乳剤 | 殺菌剤 | 1990/11/7 | 2011/11/6 | やなぎ | さび病 | 3000倍 | 200～300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 |
| 17715 | ヘキサコナゾール水和剤 | アンビルフロアブル | 殺菌剤 | 1990/11/7 | 2011/11/6 | せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 |
| 17716 | ヘキサコナゾール水和剤 | ヤシマアンビルフロアブル | 殺菌剤 | 1990/11/7 | 2011/11/6 | せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 |
| 18686 | イミベンコナゾール乳剤 | マネージ乳剤 | 殺菌剤 | 1994/4/8 | 2012/4/7 | せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | 0.2～0.7L/m ² | 発病初期 | 6回以内 | 散布 |
| 21322 | ヘキサコナゾール水和剤 | STアンビルフロアブル | 殺菌剤 | 2004/8/4 | 2010/8/3 | せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 |
| 21784 | ヘキサコナゾール水和剤 | 協友アンビルフロアブル | 殺菌剤 | 2006/9/20 | 2012/9/19 | せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 |
| 22015 | クレソキシムメチル水和剤 | ストロビードライフロアブル | 殺菌剤 | 2007/9/19 | 2010/9/18 | せいようきんしばい | さび病 | 3000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 |
| 22016 | クレソキシムメチル水和剤 | クミアイストロビードライフロアブル | 殺菌剤 | 2007/9/19 | 2010/9/18 | せいようきんしばい | さび病 | 3000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 |
| 22017 | クレソキシムメチル水和剤 | 日産ストロビードライフロアブル | 殺菌剤 | 2007/9/19 | 2010/9/18 | せいようきんしばい | さび病 | 3000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 |
| 22018 | クレソキシムメチル水和剤 | 日曹ストロビードライフロアブル | 殺菌剤 | 2007/9/19 | 2010/9/18 | せいようきんしばい | さび病 | 3000倍 | 200～700L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 |