

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	用途名称	登録年月日	有効期間	適用場所	樹種名	病害虫名称	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用回数	使用方法
14341	MEP油剤	パインサイドS油剤D	殺虫剤	1980/7/31	2010/7/30	伐採地、貯木場	樹木類(伐倒木)	カミキリムシ類	原液			-	本剤をそのまま伐倒木樹皮の表面に表面積1㎡当り400～600mlの割合で散布する
14342	MEP油剤	ヤシマバークサイドF	殺虫剤	1980/7/31	2010/7/30	伐採地、貯木場	樹木類(伐倒木)	カミキリムシ類	原液			-	本剤をそのまま伐倒木樹皮の表面に表面積1㎡当り400～600mlの割合で散布する
14343	MEP油剤	パインサイドS油剤C	殺虫剤	1980/7/31	2010/7/30	伐採地、貯木場	樹木類(伐倒木)	カミキリムシ類	40～60倍(灯油で希釈)		-	-	本剤の所定希釈液(灯油で希釈)を伐倒木樹皮の表面に表面積1㎡当り400～600mlの割合で散布する
14344	MEP油剤	ヤシマバークサイドオイル	殺虫剤	1980/7/31	2010/7/30	伐採地、貯木場	樹木類(伐倒木)	カミキリムシ類	40～60倍(灯油で希釈)		-	-	本剤の所定希釈液(灯油で希釈)を伐倒木樹皮の表面に表面積1㎡当り400～600mlの割合で散布する
15042	MEP乳剤	住化スミパイン乳剤	殺虫剤	1982/4/22	2012/4/21		樹木類	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	成虫の発生初期 又は直前	6回以内	樹幹散布
15042	MEP乳剤	住化スミパイン乳剤	殺虫剤	1982/4/22	2012/4/21		樹木類(倒木、伐倒木)	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	伐倒・風倒直後 樹皮下及び材内 生息期	6回以内	散布
15043	MEP乳剤	サンケイスミパイン乳剤	殺虫剤	1982/4/22	2012/4/21		樹木類	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	成虫の発生初期 又は直前	6回以内	樹幹散布
15043	MEP乳剤	サンケイスミパイン乳剤	殺虫剤	1982/4/22	2012/4/21		樹木類(倒木、伐倒木)	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	伐倒・風倒直後 樹皮下及び材内 生息期	6回以内	散布
15044	MEP乳剤	ヤシマスミパイン乳剤	殺虫剤	1982/4/22	2012/4/21		樹木類	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	成虫の発生初期 又は直前	6回以内	樹幹散布
15044	MEP乳剤	ヤシマスミパイン乳剤	殺虫剤	1982/4/22	2012/4/21		樹木類(倒木、伐倒木)	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	伐倒・風倒直後 樹皮下及び材内 生息期	6回以内	散布
17141	MEP乳剤	井筒屋スミパイン乳剤	殺虫剤	1988/11/8	2012/11/7		樹木類	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	成虫の発生初期 又は直前	6回以内	樹幹散布
17141	MEP乳剤	井筒屋スミパイン乳剤	殺虫剤	1988/11/8	2012/11/7		樹木類(倒木、伐倒木)	カミキリムシ類 (スギカミキリを除く)	50～150倍	300～600ml/㎡	伐倒・風倒直後 樹皮下及び材内 生息期	6回以内	散布